

ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಕೊರತೆಯ

ಲಕ್ಷಣಗಳು:-

ಒಂದು ಸಸ್ಯ ತನ್ನ ಜೀವನಚಕ್ರವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಲು 17 ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಒಟ್ಟು 17 ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಗಾಲ ಜಲಜನಕ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕವು ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಪಾತ್ರ ನಗಣ್ಯ. ಉಳಿದ 14 ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮಣ್ಣಿನಿಂದಲೇ ದೊರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಪಾತ್ರವು ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ಈ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಮುಂದಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ
ಪ್ರೈಮರಿ – 3 ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು,
(1) ಸಾರಜನಕ
(2) ರಂಜಕ
(3) ಪೋಟ್ಯಾಶ್

ಸೆಕೆಂಡರಿ – 3 ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು.
(1) ಕ್ಯಾಲ್ಷಿಯಂ
(2) ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ
(3) ಸಲ್ಫರ್

ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು - 8 ಬಗೆಯ

ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿವೆ :-

ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಕಂಡು ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ.

- (1) ಜಿಂಕ್
- (2) ಫೆರಸ್
- (3) ಕಾಪರ್
- (4) ಬೋರಾನ್
- (5) ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್
- (6) ಮ್ಯಾಲಿಬ್ಡಿನಂ
- (7) ಕೋರೈಡ್
- (8) ಸೋಡಿಯಂ

ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ವಿವಿಧ
ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ವಿವಿಧ
ಹಂತಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು.

ಅಧಿಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ

ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ
ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯದೆ ಸಸ್ಯಗಳು
ಕೊರತೆಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು
ಇಳುವರಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ
ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಮಧ್ಯಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ (ಅದೃಶ್ಯ ಕೊರತೆ)

ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಆದರೂ ಸಸ್ಯಗಳು ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಳುವರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ

ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಬೆಳೆಯ ಇಳುವರಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ, ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಒದಗುವಿಕೆ (ವಿಷಕಾರಿ)

ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು
ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ
ದೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇಳುವರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕೆಂಡುಬರುವ ಚಿಹ್ನೆಗಳು

(1) ಸಸ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತವಾಗಬಹುದು.

(2) ಸಸ್ಯಗಳು ಎಳೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ
ಒಣಗಿಹೋಗಬಹುದು.

(3) ಸಸ್ಯದ ಶರೀರದೊಳಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಹಾರ
ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗದೆ ವಿವರ್ಣವಾಗಬಹುದು

ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ


ಕಂಡುಬರುವ ಚಿಹ್ನೆಗಳು :-

(4) ಸಸ್ಯದ ಶರೀರದೊಳಗೆ ನೀರು /
ಆಹಾರವು ಚಲಿಸುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ
ತಡೆಯುಂಟಾಗಿ ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಪರೀತ್ಯ
ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

(5) ಬೆಳೆಯು ತಡವಾಗಿ ಮಾಗಬಹುದು
ಅಥವಾ ಅತಿ ಶೀಘ್ರ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ
ಬರಬಹುದು.

(6) ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು.

(7) ಉತ್ಪನ್ನದ ಗುಣಮಟ್ಟ
ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು.



ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ
ಕೊರತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು

ಸಾರಜನಕ

ಅತಿ ಆಮ ಹಾಗೂ ಅತಿ ಕ್ಷಾರ
ಮಣುಗಳಲಿ ಸಾರಜನಕದ ಕೊರತೆಯನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಸಾರಜನಕದ ಕೊರತೆ ಇದಾಗ ಸಸ್ಯಗಳು ಗಿಡವಾಗುತ್ತವೆ
ಮತ್ತು ಹರಿತ್ತಿನ ನಾಶದಿಂದ ಹಳೆ ಎಲೆಗಳು ಹೆಳದಿಯಾಗಿ
ಕಾಣುತ್ತವೆ.

ಗೋದಿಯಲಿ ಸಾರಜನಕದ ಕೊರತೆಯಿಂದ
ಸಸ್ಯಗಳು ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಲೆಗಳು ಹೆಳದಿ
ಹಸಿರು ಬಣ್ಣವೆನ್ನು ತಾಳಿ ತುದಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಣಗ
ತೊಡಗುತ್ತವೆ.

ಸಾರಜನಕ

ಹತ್ತಿ ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿ ಹಸಿರು
ಬಣ್ಣವನ್ನು ತಾಳಿ ಸಸ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ
ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಾರಜನಕದ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಕೊರತೆಯಿಂದ
ಶೇಂಗಾಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ
ಹಳದಿ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು
ಹಾಗೂ ಎಲೆಯ ಬಣ್ಣವು ತಿಳಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ
ತಿರುಗುತ್ತದೆ.

ಸಾರಜನಕ

ತಂಬಾಕಿನ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ
ಎಲೆಗಳು ಕಿತ್ತಳೆ ವರ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಒಣಗುತ್ತದೆ.
ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯದ ಗಾತ್ರವು
ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.ಸಾರಜನಕದ ಕೊರತೆಯು
ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ ಕೆಳಗಿನ ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಿ
ಉದುರಿ ಬೀಳುತ್ತವೆ.

Nitrogen deficiency in cotton



Nitrogen deficiency in corn



ರಂಜಕ (PHOSPHOROUS)

ಜೋಳ, ಮೇವಿನ ಜೋಳ ಮತ್ತು ತೃಣಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆಗಳು ರಂಜಕದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಾರವು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಡಗಳು ನೇರಳೇ ಬಣ್ಣ ತಾಳುತ್ತವೆ.

ಹತ್ತಿಯ ಬೆಳೆಯಲಿ ರಂಜಕದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಎಲೆಗಳ ಬಣ್ಣವು ದಟ್ಟ ಹಸಿರಾಗಿ ಗಿಡಗಳು ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

ರಂಜಕ (PHOSPHOROUS)

ದ್ವಿದಳಧಾನ್ಯದ ಬೆಳೆಗಳು ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಾರವು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂ ಬಿಡುವುದು ಮತ್ತು ಕಾಳು ಕಟ್ಟುವಿಕೆ ತಡವಾಗುತ್ತದೆ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಹಸಿರು ಛಾಯೆಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಬಹುದು.

ರಂಜಕದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಎಲೆಗಳ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನೇರಳೆ ವರ್ಣದ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವು. ಕೊರತೆಯು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಎಲೆಗಳು ಇದೇ ವರ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಎಲೆಗಳ ಗಾತ್ರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ಸಸ್ಯಗಳು ತಡವಾಗಿ ಫಲಕೊಡುತ್ತವೆ.

ರಂಜಕ (PHOSPHOROUS)

ಬೆಳೆಗಳು ರಂಜಕದ ಕೊರತೆಯಿಂದ
ಬಳಲುತ್ತಿರುವಾಗ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಮುಂಚೆಯೇ
ಬಲಿಯುತ್ತವೆ.

ರಂಜಕವು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು
ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಅತೀವ ಸಾರಜನಕದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು
ಸುಧಾರಿಸಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಹಲವು ರೋಗಗಳಿಗೀಡಾಗುವುದನ್ನು
ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ.

ರಂಜಕದ ಕೊರತೆಯು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸಿ
ಧಾನ್ಯಗಳ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆಂಡೆ ಬೆಡೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು
ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ.



Phosphorus deficiency in wheat



ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ

ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳ ಅಂಚುಗಳು ಹಳದಿ ಅಥವಾ ಸುಟ್ಟಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಚಲನಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಕೊರತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮೊದಲು ಹಳದಿ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕೊರತೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಸೂಚನೆ ವೆಂದರೆ ರೋಗನಿರೋಧಕತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಅಥವಾ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳೆಗಳೆಲ್ಲ ಚಳಿಗಾಲದ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ

ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕೊರತೆಯ ಮೊದಲನೆ
ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಸಸ್ಯಗಳ ಗಿಡ್ಡವಾಗುವಿಕೆ. ಜೋಳ ಮತ್ತು
ಮೇವಿನ ಜೋಳದ ಎಳೆಯ ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯುಕ್ತ ಹಸಿರು
ಇಲ್ಲವೆ ಹಳದಿ ವರ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ. ಎಲೆಯ ಅಂಚು
ಹಾಗೂ ತುದಿಗಳು ಒಣಗಿ, ಸುಟ್ಟಂತಾಗಿ ಅವುಗಳ
ಅಂಚುಗಳು ಒಣಗುವವು ತೆನೆಗಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಳು
ಕಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಣ್ಣಕಾಳಿನ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳು ಅಂಚಿನಕಡೆಯಿಂದ
ಹಳದಿಯಾಗಿ ಸುಟ್ಟಂತೆ ಆಗುತ್ತವೆ ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಸಸ್ಯಗಳ
ಕಾಂಡಗಳು ತೆಳುವಾಗುತ್ತವೆ.

ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ

ಹತಿಯ ಎಲೆಗಳಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಹಳದಿ ಚುಕ್ಕೆಗಳು
ಕಂಡುಬಂದು ಅವು ಮುಂದೆ ಕಂದು ವರ್ಣಕ್ಕೆ ತೆರುಗಿ
ಒಣಗುತ್ತವೆ.

ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕೊರತೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಇಡೀ
ಎಲೆಯು ಕೆಂಪುಗಂದು ಬಣ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿ
ಉದುರಿಬೀಳುತ್ತದೆ ಹತಿಯ ಕಾಯಿಗಳು
ಪೂರ್ಣತುಂಬಿಕೊಳ್ಳದೆ ಸಣ್ಣವಾಗುತ್ತವೆ.

ಅಗಲ ಎಲೆಯುಳ್ಳ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆಗಳಲಿ
ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ
ಅವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಹಳದಿ ಕಲೆಗಳು ಅಂಚುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ
ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹಳದಿ ಭಾಗವು ಬೇಗೇನೇ
ಮುರಟಿಹೋಗಿ ಎಲೆಯು ಕೆಳಗಡೆ ಮುದುಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ

ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಎಲೆಗಳು ಮೊದಲು ಹಳದಿ ಹಾಗೂ ನಂತರ ಕಂದು ವರ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಉದುರಿಬೀಳುತ್ತವೆ. ಕಂದುವರ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದು ಎಲೆಯ ಅಂಚುಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಒಳಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಮೇಲಿನ ಎಲೆಗಳು ಇದೇ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಸಸ್ಯಗಳು ದಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಾಗುತ್ತದೆ.

Potassium deficiency in apples



Potassium deficiency in alfalfa



ಕ್ಯಾಲಿಯಂ (ಸುಣ್ಣ)

ಕ್ಯಾಲಿಯಂ ಸಹ ಪ್ರಮುಖ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಂತೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲಿ ಸಸ್ಯಗಳಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ನೈಜ ಅಗತ್ಯವು ಮುಖ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಕ್ಯಾಲಿಯಂ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಎಲೆಗಳ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲಿ ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಕ್ಷಯಿಸಿ ಸುಣ್ಣ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಕಾಂಡದ ತುದಿಯು ನಾಯುತ್ತದೆ. ಸುಣ್ಣದ ಕೊರತೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಬೇರಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಬೇರು ಕೊಳೆಯುತ್ತದೆ.

ದ್ವಿಧಳ ಧಾನ್ಯಗಳಲಿ ಎಲೆಗಳು ಮೇಲಿದ್ದು ದೊನೆಯಾಕಾರವಾಗುವುದು. ತುದಿ ಎಲೆಗಳು ಪತ್ರ ಹರಿತನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತು ತಿರುಚಿಕೊಂಡು ವಿಕಾರವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ.

ಕ್ಯಾಲಿಯಂ (ಸುಣ್ಣ)

ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ತುರಿ ಕೊಳೆಯುವುದು ಸಮಾನ್ಯ ತೆನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಳು ಕಟ್ಟುವಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನೆಲಗಡಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಣ್ಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕಾಯಿಗಳು ಜೊಳ್ಳಾಗುತ್ತವೆ.

ಟೋಮ್ಯಾಟೊ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಟನಲ್ಲಿ ಕೊಳೆ ರೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

Calcium deficiency in sugarbeets



Calcium deficiency in alfalfa



ಮೆಗ್ನೇಷಿಯಂ

ಮೆಗ್ನೇಷಿಯಂ ಕೊರತೆ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ನರ ಹರಿದ್ವಿಹೀನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೆಗ್ನೇಷಿಯಂ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕೇವಲ ಎಲೆಗಳು ಬಿಳುಚೆಕೊಳ್ಳುವ ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ಸಸ್ಯವರ್ಣದ್ರವ್ಯಗಳಾದ ಝಿಂಕ್‌ಪಿಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರೋಟಿನಗಳು ಕೂಡಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ.

ಅಂತರ್ನರ ಹರಿದ್ವಿಹೀನತೆ ಇರುವ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನರಗಳು ಮಾತ್ರ ಹಸಿರಾಗಿದ್ದು ನರಗಳ ಮಧ್ಯಬಾಗೆ ಹಳದಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇವಿನ ಜೋಳದಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ನೇಷಿಯಂ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆಯಾದರೆ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ನರ ಹರಿದ್ವಿಹೀನತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಮಗ್ಗೇಷಿಯಂ

ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯದ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಗ್ಗೇಷಿಯಂ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಎಲೆಗಳ ಮುಖ್ಯ ನರಗಳ ಮಧ್ಯಬಾಗವು ಮಬ್ಬು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ತಾಳಿ ನಂತರ ಹಳದಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಹೊಂದುತ್ತದೆ. ನರಗಳ ಬಣ್ಣ ಹಸಿರು ಇರುತ್ತದೆ.

ಮಗ್ಗೇಷಿಯಂ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಎಲೆಗಳು ನೇರಳೆಗೊಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ತಾಳುತ್ತವೆ ಆದರೆ ನರಗಳ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಹಸಿರಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ.

Magnesium deficiency in alfalfa



Magnesium deficiency in sugarcane



ಗಂಧಕ (SULFER)

ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಗಂಧಕದ ಕೊರತೆಯಾಗಬಹುದು. ಆಗ ಸಸ್ಯಗಳು ಗಿಡ್ಡವಾಗಿ ಹೊಸ ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿವರ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ.

ಮೂಲಂಗಿಯಂತಹ ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಎಲೆಗಳು ಕೆಂಪಾಗುತ್ತವೆ. ಮುಂದೆ ಅವುಗಳೆ ಎಲ್ಲಾ ಎಲೆಗಳು ಕೆಂಪಾಗಬಹುದು.

ಗಂಧಕದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ನಿಂಬೆ ಜಾತಿಯ ಬೆಳೆಗಳ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೋರೊಸಿಸ್ (ಬಿಳಿಚುಕ್ಕೆ) ರೋಗ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಪಕ್ವವಾದ ಹಣ್ಣಿನ ತೂಕವು ಸಹಜವಾದ ಹಣ್ಣಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.

Sulphur deficiency in cotton



Sulphur deficiency in corn



ಸತು (ZINC)

ಸತುವಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ
ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ತೀವ್ರವಾಗಿ
ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಅಮೈನೊ ಆಮ್ಲಗಳು
ಹಾಗೂ ಅಮೈಡಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ.

ಸತುವಿನ ಕೊರತೆಯಿರುವ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ
ಹರಿದ್ರೇಣುವಿನ ಪ್ರಮಾಣವು ಸಾಮಾನ್ಯ
ಸಸ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪತ್ರ
ಹರಿತ್ತಿನ ಅಂಶವು ಕೂಡಾ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ದರಿಂದ
ಎಲೆಗಳು ಬಿಳುಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಸತು (ZINC)

ಸತುವಿನ ಕೊರತೆಯಿರುವ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಆಕ್ಸನ್ ಮಟ್ಟವು ಟ್ರಿಪ್ಲೋಫಾನ್ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಲೆಯ ಪ್ರದೇಶವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುಕಡಿಮೆ ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿನ ಎಲೆಗಳು ವಿರೂಪಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಸತುವಿನ ಕೊರತೆಯು ಕಾಂಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬೇರಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬಿರುತ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕನಾಳಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿನ ಸಸ್ಯ ಅಂಗಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ನೇರವಾದೆ ಪಟ್ಟಿಯು ಹಸಿರಾಗೇ ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾಳಗಳ ಮಧ್ಯದ ಅಂಗಾಂಶವು ಹಳದಿ ಹಸಿರು ಮುಸುಕಿದ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಸತು (ZINC)

ತಂಬಾಕಿನಲ್ಲಿ ಸತುವಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಮೇಲಿನ ಎಲೆಗಳು ಮೊದಲಿಗೆ ಅಂಚು ಮತ್ತು ತುದಿಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಂತರ ಆ ಭಾಗಗಳು ಸಾಯತೊಡಗಿ ಕಡೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ಎಲೆಯೇ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೇವಿನ ಜೋಳದಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆಯು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ತಾಳುತ್ತದೆ. ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಲೆಗಳ ನರಗಳೆ ಮಧ್ಯೆ ಹಳದಿ ಗೆರೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬಿಳಿ ಕಲೆಗಳುಂಟಾಗುತ್ತವೆ.

ಸತು (ZINC)

ಬಟಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂದು ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಎಲೆಯ ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ನಿಂಬೆ ಜಾತಿಯ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸತುವಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ಕೆಲೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಎಲೆಗಳು ಅಗಲವಾಗದೆ ಸುರಳಿಗಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಅಂಚುಗಳು ಅಲೆಯಂತಾಗುತ್ತವೆ. ಕಾಯಿಗಳ ತೊಗಟೆಗಳು ದಪ್ಪವಾಗುತ್ತವೆ.

Zinc deficiency in corn



Zinc deficiency in rice



ಕಬ್ಬಿಣ (IRON)

ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆಯಿರುವ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು
ಕಿಣ್ವಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಂಡು ಮತ್ತು
ಆಗಾಗ್ಗೆ ಒಟ್ಟು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ
ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಎಲೆಗಳು ಅಗಲವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹಳದಿಯ
ವರ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ.

ಕಬ್ಬಿಣ (IRON)

ತಂಬಾಕಿನಲ್ಲಿ ಕೋರೋಸಿನ್ ರೋಗವು
ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಆಗ ಅದರ ಕಾಂಡಗಳು
ಮೃದುವಾಗುತ್ತವೆ. ಕೊರತೆ ಅತಿಯಾದರೆ ಎಲೆಗಳು
ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ.

ನಿಂಬೆ ಜಾತಿಯ ಗಿಡಗಳ ಎಲೆಗಳು ಕಿತ್ತಳೆ
ವರ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಎಲೆಗಳ ನರಗಳ ಮಧ್ಯೆ
ಬಾಗ ಹಸಿರಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.

ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯದ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ
ಕೊರತೆಯಿಂದ ಮೇಲಿನ ಎಲೆಗಳು ಸುರುಳಿಯಾಗಿ
ಹಳದಿಯ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ ಕೊರತೆ ಅತಿಯಾದಲ್ಲಿ
ನರ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯೆ ನರಗಳು ಬೆಳ್ಳಗಾಗುತ್ತವೆ.

Iron deficiency in coffee



Iron deficiency in sugarbeets



ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್

ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಕೊರತೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಎಂದರೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆಯಿದ್ದಾಗ ಬಿಳಿಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅಂತರ ನಾಳಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬಿಳಿಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೆ ಎಲೆಗಳು ತನ್ನ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಲವಾದ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದಾಗ ಎಲೆಗಳ ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಕೊರತೆಯಾದರೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲೋರೋಸಿಸ್ ಚಿಹ್ನೆಯು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.

ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್

ತಂಬಾಕಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ತ ಅಂಗಾಂಶಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಚುಕ್ಕೆಗಳಾಗುವವು. ಸಸ್ಯವು ಗಿಡ್ಡವಾಗಿ ಅದರ ಬಣ್ಣವು ತಿಳಿ ಹಸಿರಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಎಲೆಕೋಸಿನ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನರಗಳು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣವಿದ್ದು ಮಿಕ್ಕೆ ಭಾಗವು ಹಳದಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಓಟ್ಸ್ ಮುಂತಾದ ತೃಣಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಕಾಣುತ್ತವೆ.

ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯದ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಿದ್ದು ನರಗಳು ಮಾತ್ರ ಹಸಿರಾಗಿರುತ್ತವೆ.

Manganese deficiency in wheat



Manganese deficiency in soybeans



ತಾಮ್ರ (COPPER)

ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಸ್ಯಗಳು ತಾಮ್ರದ ಕೊರತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ ಸರ್ವೇಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗರಿಗಳು ಒಣಗಿ ಎಲೆಗಳೆ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಸಿಸ್ ರೋಗ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.

ತೃಣಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಎಲೆಗಳು ಹರಿತ್ತನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಾಡಿಸಾಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವು ಸುರುಳಿಗಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ಕೊರತೆಯು ತೀವ್ರವಾದಾಗ ತೆನೆ ಹೊಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ತೆನೆ ಹೊಡೆದರೆ ಕಾಳು ಕಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ.

ತಾಮ್ರ (COPPER)

ತಾಮ್ರದ ಕೊರತೆ ಇದ್ದರೆ ಟೋಮ್ಯಾಟೋ ಸಸ್ಯ
ಎತ್ತರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬೇರುಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ
ವೃದ್ಧಿಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲೆಗಳು ಮುರುಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ
ಹೊಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಸೋಯಾಬೀನ್ ಶೇಂಗಾ ಮುಂತಾದ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ
ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳು ತಿಳಿ ಹಸಿರು ಬಣವನ್ನು ತಾಳಿ
ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ಎಲೆಗಳು ಬಾಡಿ
ಉದುರುತ್ತವೆ.

ನಿಂಬೆ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮುದುಡಿಕೆ
ಉಂಟಾಗಿ ಮಧ್ಯದ ನರವು ಬಾಗುತ್ತದೆ ತಾಮ್ರದ ತೀವ್ರ
ಕೊರತೆಯಾದರೆ ಹಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು
ಚುಕ್ಕೆಗಳುಂಟಾಗುತ್ತವೆ.

Copper deficiency in citrus



Copper deficiency in onions



ಬೋರಾನ್

ಬೋರಾನ್ ಹೂ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಬೀಜ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಡಾಂಶಗಳ ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಹೂಗಳಲ್ಲಿ ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಮೇವಿನ ಜೋಳದಲಿ ಬೋರಾನಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಿ ಕೊಂಡಗಳು ದುರ್ಬಲವಾಗುತ್ತವೆ ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಸಸ್ಯವು ಬಂಜೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಸಸ್ಯದ ಮೇಲಾಗದ ಗಣಿಕೆಗಳು ಉದ್ದವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯು ಬೋರಾನಿನ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಳೆಯ ಅಂಗಾಂಶ ಸುರುಳಿಗಟ್ಟಿ ವಿಕೃತ ರೂಪವನ್ನು ತಳೆಯುತ್ತದೆ.

Boron deficiency in canola



Boron deficiency in canola



ಮಾಲಿಬ್ಬಿನಂ

ಮಾಲಿಬ್ಬಿನಂ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ
ಟೊಮ್ಯಾಟೊದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಎಲೆಗಳು ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೂ
ಎಳೆಯ ಎಲೆಗಳು ತಿಳಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೂ
ತಿರುಗುತ್ತವಲ್ಲದೆ ನರಗಳ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಲಕ್ಷಣ
ಬಣ್ಣಗಳು ಕಾಣುತ್ತವೆ ಹಳೆಯ ಎಲೆಗಳು ಸುತ್ತಲೂ
ಬಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಗೋದಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳು ಹರಿತ್ತನ್ನು
ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ತೆನೆಗಳು ಜೊಳ್ಳಾಗುತ್ತವೆ.

ಮಾಲಿಬಿನಂ

ಬಟಾಣಿಯ ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಿ
ಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಲೆಗಳ ನರಗಳ ಹತ್ತಿರ
ಮಾತ್ರ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣವಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಅದೇರ
ಅಂಚುಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಂದು ಬಣ್ಣವಿದ್ದು ಒಳಗೆ
ಸುರುಳಿಗಟ್ಟುತ್ತವೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಗಿಡ್ಡವಾಗುತ್ತವೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಲಿಬಿನಂ ಕೊರತೆಯಿಂದ
ಹರಿತು ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ವಿಲಕ್ಷಣ ಬಣ್ಣಗಳು ಎಲೆಯ
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಬಾಗುತ್ತವೆ
ಎಲೆಗಳು ಸುಟ್ಟಂತೆ ಆಗುತ್ತವೆ.

Molybdenum deficiency in sugarcane



Molybdenum deficiency in cauliflower



ಕ್ಲೋರೈಡ್

ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಎಲೆಗಳು ಬಾಗುತ್ತವೆ
ಹಾಗೂ ಕ್ಲೋರೋಸಿಸ್ ಮತ್ತು ನೆಕ್ರೋಸಿಸ್
ರೋಗಗಳಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತವೆ.

Chloride deficiency in wheat



ಸೋಡಿಯಂ

ಪೊಟ್ಟಾಷಿಯಂ ಸಂರಕ್ಷಕವಾಗಿ
ಸೋಡಿಯಂನ ಬಳಕೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಷಾರೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ
ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಂಜು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗ್ಗೆ
ಯಾವುದೇ ವಿಷಕಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ
ಇತರ ಲವಣಗಳು ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗ್ಗೆ ಮಣ್ಣಿನ
ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪ್ಪಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಗೆ
ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ.

ಭಾಷ್ಪಿಕರಣ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ
ಸಸ್ಯಗಳು ಒಣಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ ಎಲೆಯ
ಹಾನಿಯು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಿಳಿಚೆಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿ ಎಲೆಯ
ತುದಿ ಮತ್ತು ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ತರಗಳ ನಡುವೆ
ಮೃತಗಾಯಗಳಾಗುತ್ತವೆ.

ಇವುಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ.

1) ಕೋಬಾಲ್ಟ್

2) ಸಿಲಿಕಾನ್

3) ಸೆಲೆನಿಯಂ

4) ವೆನೆಡಿಯಂ

ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿವೆ
ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇವುಗಳ ಕೊರತೆಯು
ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ.

ಧನ್ಯವಾದಗಳು.